

54% DELS NOUS DIAGNÒSTICS

de **VIH** es produeixen en homes que tenen sexe amb homes (**HSH**)

38,4%

dels **HSH** presentaven diagnòstic tardà (<350 CD4**)



35

Edat mitjana

1

de cada

3

nous diagnòstics té menys de < 30 anys

VIH

El 2015 s'han diagnosticat **1.837** casos de **VIH** en **HSM** a Espanya

1

de cada

10

HSH amb pràctiques de risc té infecció per **VIH**

1

de cada

3

casos de **sífilis** i **gonocòccia** en **HSH** han sigut transmèses a través del **sexe oral**

En els últims anys s'ha produït un augment significatiu de les **infeccions de transmissió sexual (ITS)**

1

de cada

3

casos de **sífilis**

en **HSH**, estava també diagnosticat de **VIH**

1


de cada

5

casos de **gonocòccia**

>50%

de les **ITS** es diagnostiquen en **HSH**



● Gonocòccia ● Sífilis

FONT: XARXA NACIONAL DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA

SENSE CONDÓ

no hi ha tornada enrere.



Font: Pla Nacional sobre la SIDA

Per a més informació:

<http://www.msc.es/ciudadanos/enflesiones/enftransmisibles/sida/home.htm>

<http://www.msc.es/ciudadanos/enflesiones/enftransmisibles/sida/homeITS.htm>

*Tendències (2009-2015): Estable

• La taxa de nous diagnòstics de **VIH** entre els **HSH** no descendeix en els últims anys.

• El percentatge de casos amb diagnòstic tardà no descendeix en els últims anys.

**Tipus de cèl·lules que constitueixen una part essencial del sistema immunitari. La seua funció principal és activar el sistema alertant-lo de la presència de patògens o d'una replicació errònia de cèl·lules humanes, perquè pugui fer-los front i corregir la situació.