

Figura 1. Algoritmo diagnóstico y tratamiento de la secreción vaginal anormal.





Figura 2.- Algoritmo de tratamiento empírico de la enfermedad ulcerosa genital



1. Diagnóstico de sífilis precoz en el primer y segundo trimestre: Penicilina G benzatina 2.400.000 UI i.m. en dosis única. Si fuera en el tercer trimestre: Penicilina G benzatina 2.400.000 UI i.m. en dosis única seguido de una nueva dosis una semana después. Aunque la mayoría de los pacientes VIH responden a este tratamiento, algunos autores recomiendan en cualquier paciente VIH añadir 2 dosis adicionales semanales de penicilina G benzatina 2.400.000 UI i.m.

Figura 3. Manejo de la sífilis en la embarazada.



Figura 4.

- A) Material para citología anal, anoscopia de alta resolución.
- B) Detalle anoscopia de alta resolución con un colposcopio




Figura 5. Algoritmo de cribado de cáncer de cérvix




Figura 6. Algoritmo de tratamiento de CIN 1-3




Figura 7.- Esquema práctico canal anal y región perianal




Figura 8.- Algoritmo de actuación según los resultados de la citología anal.






Figura 9.- Algoritmo de interpretación del resultado de citología.




Figura 10. Localización de las amígdalas