



Consumo de drogas recreativas y su uso sexualizado en hombres gay, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres en España. Resultados estudio EMIS-2017


Cinta Folch^{1,3}, Asunción Díaz⁴, María C. Vázquez⁵, Sebastian Meyer², Jordi Casabona^{1,3}

¹ Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya (CEEISCAT); ² Área de Investigación, Stop Sida; ³ CIBERESP; ⁴ Centro Nacional de Epidemiología. Unidad de Vigilancia del VIH y Comportamientos de Riesgo ⁵ Secretaria del Plan Nacional sobre el sida; Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Contacto: cfolch@iconcologia.net

Introducción

- El consumo de drogas antes o durante las relaciones sexuales en hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH) no es un fenómeno nuevo.



- Nuevas drogas recreativas
- Vía inyectada (Slamsex)
- Se empieza a ver los efectos del consumo
- Las drogas que se utilizan pueden ser cualquiera que sirva para mejorar la experiencia sexual (sensaciones, intensidad, rendimiento, duración, etc.).



Chemsex. Uso intencionado de drogas para tener relaciones sexuales por un período largo de tiempo (que puede durar varias horas hasta varios días)*

* Fernandez-Davila et al, Rev. Multidisciplinar del Sida, 2016



Objetivo

- Describir la prevalencia y el patrón de consumo de drogas recreativas para tener relaciones sexuales en hombres gay, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH) residentes en España.
- Analizar los factores individuales, psico-sociales y conductuales asociados al consumo de drogas recreativas.



- Encuesta Europea para Hombres que tienen sexo con hombres (EMIS-2017)*.
- Cuestionario online (3 meses), 33 idiomas, 50 países.
- En España, estuvo a cargo del CEEISCAT con la colaboración de Stop Sida, el PNS y el CNE.
- Se recogió información sobre conductas sexuales, consumo de drogas, salud psicosocial, prueba del VIH/ITS, entre otras.
- Reclutamiento: principalmente en apps y páginas de contacto gay; también a través de ONGs, revistas digitales, Facebook, etc.

*EMIS2017 fue realizado por Sigma Research (LSHTM), parte del proyecto **ESTICOM** (www.esticom.eu), y financiado por el Programa de Salud de la UE 2014-2020.

Páginas web y apps nacionales e internacionales



Revistas digitales



Organizaciones LGTB y/o de prevención del VIH






Figure 2.2



Number of respondents and crude recruitment rate per country
 N=127 792 for Europe



Number of respondents




Crude recruitment rate




10.634 participantes en España

Citation: The EMIS Network. EMIS-2017: The European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey
 Authors: Peter Weatherburn, Ford Hickson, David S. Reid, Susanne B. Schink, Ulrich Marcus, Axel J. Schmidt
 Primary Funding: EU Health Programme 2014-2020
www.emis2017.eu




Distribución de participantes según edad (n=10.634)



Tamaño del municipio de residencia		
	n	%
Más de un millón de habitantes	3.985	37,9
Entre 500.000-999.999 habitantes	1.231	11,7
Entre 100.000-499.999 habitantes	2.492	23,7
Entre 10.000-99.999 habitantes	1.928	18,3
Menos de 10.000 habitantes	889	8,4


*Un total de 109 participantes no contestaron a la pregunta

Identidad sexual (n=10.624)






Consumo de alcohol y drogas (últimos 12 meses)




Porcentaje

* El consumo de cada droga fue preguntado por separado: **drogas legalizadas

Uso inyectado de drogas alguna vez




Tipo de drogas usadas por vía inyectada



* El consumo de cada droga fue preguntado por separado: **drogas legalizadas

“Cuándo fue la última vez que utilizaste drogas estimulantes para hacer que el sexo fuera más intenso o que durara más tiempo?”*

Uso sexualizado de drogas




Entre los hombres que habían consumido alguna vez drogas estimulantes para tener relaciones sexuales, el **50,7%** las había consumido con **más de un hombre (trío o sexo en grupo)** en los últimos 12 meses.

* Uso de drogas estimulantes (éxtasis/MDMA, cocaína, speed, metanfetamina, mefedrona y ketamina) para hacer que el sexo fuera más intenso o que durara más tiempo.



Lugar del último encuentro de sexo en grupo y consumo de drogas con fines sexuales




**calle, área de servicio, parque, playa, baños



Uso sexualizado de drogas (últimas 4 semanas)

*
 Uso sexualizado de drogas (Últimas 4 semanas)

- 0 - ≤ 4.7
- ≥ 4.8 - ≤ 8.8
- ≥ 8.9




Comunidad Autónoma	
Extremadura	1.9%
Cantabria	3.3%
Castilla - La Mancha	3.6%
Región de Murcia	3.8%
Castilla y León	3.8%
Galicia	4.3%
Andalucía	4.7%
Pais Vasco	4.9%
Principado de Asturias	4.8%
Aragón	5.0%
Comunidad Valenciana	6.5%
Canarias	7.3%
Comunidad de Madrid	8.8%
Cataluña	10.6%
Islas Baleares	12.4%

*Solamente se calculó el indicador para CCAA con más de 100 participantes.




Subgrupos con mayor prevalencia de consumo de drogas con fines sexuales (últimas 4 semanas)



*últimos 12 meses

Factores asociados al consumo de drogas con fines sexuales (últimas 4 semanas).
Análisis de regresión logística multivariante




*últimos 12 meses



Preocupación en relación a su consumo de drogas*

“Me preocupa mi consumo de drogas recreativas”



*Entre los 6.078 participantes en EMIS que declararon consumir drogas en el último año (excluyendo alcohol, tabaco y viagra)



- Más del 70% de la muestra fue captada en páginas web/app dirigidas a encuentros sexuales (sobrestimación de conductas sexuales).
- Diferencias entre muestras online vs. muestras offline.
- Datos auto-reportados.
- Estudio transversal, no se pueden establecer relaciones de causalidad entre las asociaciones observadas.



- El consumo general de drogas es **elevado y en aumento** (en 2010: 51%).
- La prevalencia del **consumo inyectado** de drogas en el último año se mantiene **similar** a la observada en 2010 (0,8%).
- **Mayor prevalencia** de consumo en ciertos subgrupos como hombres que tienen el VIH, nacidos fuera de España, trabajadores sexuales y usuarios de la PrEP.
- Se observa una **asociación** entre el consumo de drogas y la infección por el **VIH** u otras **ITS**.
- El uso sexualizado de drogas es una práctica que ocurre en gran medida en **grandes ciudades**.

- El uso sexualizado de drogas debe ser analizado desde una perspectiva de salud integral, holística y de bienestar.
- Se deben de identificar las barreras de acceso a la red de atención de drogodependencias del sistema de salud, así como implementar servicios multidisciplinares que atiendan las necesidades de esta población.
- Urgen acciones a nivel de prevención, y de reducción de riesgos y daños, en la población de hombres GBHSH que usan drogas con fines recreativos, en particular en ciertos subgrupos vulnerables.

Agradecimientos

- Todos los hombres GBHSH que participaron en EMIS2017.
- Coordinadores de EMIS2017: Axel J. Schmidt, Ford Hickson, David Reid, y Peter Weatherburn (Sigma Research (LSHTM)).
- PlanetRomeo, European AIDS Treatment Group (EATG), Eurasian Coalition on Male Health (ECOM), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), European Monitoring Centre for Drugs & Drug Addiction (EMCDDA), European Commission (DG SANTE).

Páginas web/apps:



Federaciones y ONGs LGBT/VIH:



Revistas digitales:



Entes gubernamentales,
coordinadoras, sociedades científicas:



Otros colaboradores:



Informe disponible en:

https://www.msrebs.gob.es/ciudadanos/enLesiones/enTransmisibles/sida/docs/EMIS_Report_07052020.pdf